

Save Lives, Use
MISOPROSTOL

زندگیاں بچائیں
ماترو پروسٹول استعمال کریں









MISOPROSTOL TABLETS TO TREAT INCOMPLETE ABORTION

ORAL OR SUBLINGUAL USE



نامکمل
استقاط حمل کے علاج کیلئے
ماتزو پروسٹول کی گولیوں کا استعمال
منہ کے ذریعے نگل کر یا زبان کے نیچے رکھ کر




TREATMENT OF INCOMPLETE ABORTION AND MISCARRIAGE WITH MISOPROSTOL TABLETS

If you are having an incomplete abortion, you can be treated safely and effectively with Misoprostol tablets. These tablets can be used in two ways: either by swallowing (oral use), or by placing them under the tongue (sublingual use).

ماٹروپروسٹول کی گولیوں سے نامکمل اسقاطِ حمل کا علاج


اگر آپ کا اسقاطِ حمل نامکمل ہو، تو آپ کا ماٹروپروسٹول کی گولیوں سے بحفاظت اور مؤثر طریقے سے علاج ہو سکتا ہے۔ یہ گولیاں دو طریقوں سے استعمال کی جاسکتی ہیں، یا تو منہ کے ذریعے نگل کر یا پھر زبان کے نیچے رکھ کر۔





HOW TO TAKE MISOPROSTOL TABLETS (oral use)



Swallow 3 tablets (600 mcg) with water.



مائٹروپروسٹول کی گولیاں کیسے لی جائیں؟
(منہ کے ذریعے)

تین گولیاں (600 mcg) پانی کے ساتھ نگل لیں۔






HOW TO TAKE MISOPROSTOL TABLETS (sublingual use)

Place 2 Misoprostol tablets (400 mcg) under your tongue. Keep the tablets under your tongue until they melt, or for about 30 minutes, and then swallow whatever is left.

مائزوپروسٹول کی گولیاں کیسے لی جائیں؟
(زبان کے نیچے رکھ کر)

مائزوپروسٹول کی دو گولیاں (400 mcg) زبان کے نیچے رکھیں۔ گولیوں کو اس وقت تک زبان کے نیچے رکھیں جب تک کہ وہ گھل نہ جائیں، یا آدھے گھٹنے تک رکھنے کے بعد جو کچھ باقی رہ جائے اُسے پانی سے نگل لیں۔








MISOPROSTOL TABLETS TO TREAT MISSED ABORTION

SUBLINGUAL OR VAGINAL USE



پوشیدہ
استقاط حمل کے علاج کیلئے
ماتزو پروسٹول کی گولیوں کا استعمال
(زبان کے نیچے رکھ کر) یا تولیدی راستے (وجائنا) کے ذریعے





TREATMENT OF MISSED ABORTION WITH MISOPROSTOL TABLETS

If you are experiencing a missed abortion, you can be treated safely and effectively with Misoprostol tablets. These tablets can be used in two ways: either by placing them under the tongue, (sublingual use) or by placing them in the vagina (vaginal use).

ماٹروپروسٹول کی گولیوں سے پوشیدہ اسقاطِ حمل کا علاج

اگر آپ کا اسقاطِ حمل پوشیدہ ہو تو آپ کا ماٹروپروسٹول کی گولیوں سے بحفاظت اور مؤثر طریقے سے علاج ہو سکتا ہے۔ یہ گولیاں دو طریقوں سے استعمال کی جاسکتی ہیں، یا تو زبان کے نیچے رکھ کر، یا پھر تولیدی راستے (وجائنا) کے اندر رکھ کر۔





00:30




* HOW TO TAKE MISOPROSTOL TABLETS (sublingual use)

Place 3 misoprostol tablets (600mcg) under your tongue. Keep tablets under your tongue until they melt, or for about 30 minutes, then swallow whatever is left. Repeat every 3 hours until expulsion (generally 1-3 doses)

* مائٹروپروسٹول کی گولیاں کیسے لی جائیں؟
(زبان کے نیچے رکھ کر)

مائٹروپروسٹول کی 3 گولیاں (600mcg) زبان کے نیچے رکھیں۔
گولیوں کو اس وقت تک زبان کے نیچے رکھیں جب تک کہ وہ گھل نہ
جائیں، یا دھو گھٹنے تک رکھنے کے بعد جو کچھ باقی رہ جائے اسے پانی سے
نگل لیں۔ ہر 3 گھنٹے بعد یہ عمل دہرائیں (عام طور پر 1 سے 3 دفعہ استعمال
کریں)





* HOW TO TAKE MISOPROSTOL TABLETS (vaginal use)


In the absence of vaginal bleeding place 4 misoprostol tablets (800mcg) in vagina and keep laying down for 30 minutes. If needed, repeat every 3 hours until expulsion (generally 1-3 doses)



00:30

Positions to place the tablets in the vagina

تولیدی راستے (وجائنا) میں 3 مختلف طریقوں سے گولیاں رکھی جاسکتی ہیں۔



* مائٹروپروسٹول کی گولیاں کیسے لی جائیں؟ (تولیدی راستے کے ذریعے)

خون نہ پڑنے کی صورت میں مائٹروپروسٹول کی 4 گولیاں (800mcg) تولیدی راستے (وجائنا) کے اندر رکھیں اور 30 منٹ تک لیٹی رہیں۔ اگر ضرورت ہو تو ہر 3 گھنٹے بعد یہ عمل دہرائیں (عام طور پر 1 سے 3 دفعہ استعمال کریں)



WHAT WILL HAPPEN WHEN YOU TAKE THE TABLETS?

Misoprostol causes the uterus to contract. You will have some vaginal bleeding and cramping and you may see blood clots.


گولیاں لینے کے بعد کیا ہوگا؟

ماٹرو پروسٹول رحم کو سکڑتی ہے۔ تولیدی راستے (وجائنا) سے کچھ خون آئے گا اور پیٹ میں مروڑ/درد ہوگا۔ کچھ خون کے جمے ہوئے ٹکڑے بھی خارج ہو سکتے ہیں۔



CRAMPING

پیٹ میں مروڑ/درد



BLEEDING

خون جاری ہونا



MANY WOMEN DO NOT HAVE SIDE EFFECTS

Some women may experience fever, chills, nausea, vomiting or diarrhoea. These side effects should go away on their own within a day.

بہت ساری عورتوں کو ضمنی اثرات نہیں ہوتے

کچھ عورتوں کو بخار، سردی، متلی، الٹی یا دست کی شکایت ہو سکتی ہے۔ یہ علامات ایک دن میں خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔



DIARRHOEA

دست آنا



FEVER / CHILLS

کپکپی / سردی لگنا / بخار ہونا



NAUSEA / VOMITING

متلی اور قے آنا



HOW CAN YOU MANAGE THE SIDE EFFECTS?

You can take pain medicines for cramps. Fever medicines are rarely needed. Drinking lots of water and getting rest will also help. Most side effects will disappear on their own in a short time.

ضمنی اثرات سے کیسے نمٹا جائے؟

پیٹ میں مروڑ کیلئے درد کم کرنے کی دوا لی جاسکتی ہے۔ بخار کیلئے دوا کی عام طور پر ضرورت نہیں ہوتی، زیادہ پانی پینے اور آرام کرنے سے بھی مدد ملتی ہے۔ زیادہ تر ضمنی اثرات تھوڑی دیر بعد خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔





WHEN SHOULD YOU SEEK HELP FROM A HEALTH CARE PROVIDER?

You should seek immediate help if you have any of the following warning signs:

! **HEAVY BLEEDING**



! زیادہ خون کا جاری ہونا

Heavy bleeding: soaking more than 2 sanitary pads per hour for 2 hours in a row, especially if accompanied by prolonged dizziness and increased fatigue.

بہت زیادہ خون آ رہا ہو: جس سے ہر ایک گھنٹے میں 2 سے زیادہ سینیٹری پیڈ زخون سے بھر جائیں، اور یہ عمل 2 گھنٹے تک لگاتار جاری رہے، خاص طور پر اگر اس کے ساتھ چکر اور بہت زیادہ تھکن بھی ہو۔

! **FEVER**



! بخار

Fever which lasts for more than a day or starts any day after the day you take Misoprostol. The feeling of being very sick, unusual or bad-smelling vaginal discharge and / or abdominal pain.

بخار ایک دن سے زیادہ رہے یا مائیزوپروسٹول لینے کے بعد کسی بھی دن شروع ہو۔ محسوس ہو کہ طبیعت بہت خراب ہے، تولیدی راستے (وجاننا) سے معمول سے ہٹ کے یا بدبودار اخراج اور / یا پیٹ میں درد ہو۔

آپ کو فوری مدد دینی چاہیے اگر:

! **CONSTANT CRAMPING**



! پیٹ میں مستقل مروڑ / درد

Constant cramping and pain that do not get better with medication, rest, or a heating pad.

مستقل پیٹ میں مروڑ / درد ہو جو کہ دوا، آرام یا گرم سیکائی سے بھی دور نہ ہو رہا ہو۔

استقاط حمل کے فوراً بعد مانع حمل طریقوں کا استعمال مزید غیر ارادی حمل سے بچاتا ہے۔

مکمل اور غیر پیچیدہ استقاط حمل کے فوراً بعد مانع حمل کے تمام طریقے استعمال کیے جاسکتے ہیں۔



استقاط حمل کے بعد


سب سے کم قابل مجروحہ

سب سے زیادہ قابل مجروحہ



* WHAT IS THE BEST CONTRACEPTIVE METHOD FOR ME?

You will be able to get pregnant again within 10 days following a vacuum aspiration and as soon as 8 days after a medical abortion. If you would like contraception, it should be started immediately. You can start most methods at the same time when you take your Misoprostol tablets.



* میرے لئے مانع حمل کا بہترین طریقہ کیا ہے؟

اسقاط حمل کا علاج ایم۔وی۔اے (MVA) سے کروانے کے بعد آپ 10 دنوں میں دوبارہ حاملہ ہو سکتی ہیں اور مائٹروپروسٹول کی گولیاں کھانے کے بعد 8 دنوں کے اندر۔ اگر آپ مانع حمل استعمال کرنا چاہتی ہیں تو حمل روکنے کے لیے کسی طریقے کا استعمال فوری شروع کریں۔ آپ مانع حمل کے زیادہ تر طریقے مائٹروپروسٹول کی گولیوں کے استعمال کے ساتھ ہی شروع کر سکتی ہیں۔





WHEN SHOULD I COME BACK FOR A FOLLOW-UP?

A routine follow-up visit is usually not necessary. If you experience the warning signs or have any other concerns, return anytime. If you would like to confirm that the process was successful, you may return in approximately two weeks.

مجھے دوبارہ معائنے کیلئے کب آنا چاہیئے؟

عام طور پر دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اگر کچھ خطرناک علامات ظاہر ہوتی ہیں یا آپ کچھ اور مسائل پر بات کرنا چاہتی ہیں تو کسی بھی وقت آ سکتی ہیں۔
اگر آپ جاننا چاہتی ہیں کہ مائٹروپروسٹول کی گولیوں کے ذریعے بچہ دانی کی صفائی کا عمل کامیاب رہا تو معائنے کیلئے دو ہفتے بعد آ سکتی ہیں۔







MISOPROSTOL

A Life-Saving Medicine

to prevent & treat Postpartum Hemorrhage (PPH)

مائٹروپروسٹول
جان بچانے والی دوا
بچے کی پیدائش کے بعد زیادہ
خون ضائع ہونے سے بچاؤ
اور علاج کیلئے

Misoprostol

Use Misoprostol immediately after childbirth and save the mother.

Excessive bleeding after childbirth is the leading cause of maternal death.

Misoprostol is a medicine which can prevent excessive bleeding after childbirth and save the mother's life.


مائزوپروسٹول


بچے کی پیدائش کے فوراً بعد مائزوپروسٹول استعمال کریں۔ ماں کی جان بچائیں۔
ماؤں کے مرنے کی سب سے بڑی وجہ بچے کی پیدائش کے بعد خون کا نارمل سے زیادہ ضائع ہونا ہے۔
مائزوپروسٹول وہ دوا ہے جو زچگی کے بعد زیادہ خون ضائع ہونے کو روک سکتی ہے اور
ماں کی جان بچ سکتی ہے۔



Pregnant women **should not take Misoprostol** tablets before the child is born.

بچے کی پیدائش سے پہلے حاملہ
مائٹرو پروسٹول کی گولیاں ہرگز استعمال نہ کرے۔






Purchase Misoprostol tablets well before the time of delivery and keep it close by during labour so that it is easily accessible.


ماتر وپروسٹول کی گولیاں پہلے سے خرید کر زچگی کے وقت قریب رکھیں۔






Immediately after the delivery of the baby, examine the abdomen and reconfirm that there is no second baby (twin).

بچے کی پیدائش کے فوراً بعد ماں کے پیٹ کا معائنہ کریں اور اطمینان کر لیں کہ پیٹ میں دوسرا بچہ تو نہیں۔






- If there is no second baby, immediately give 3 tablets of Misoprostol to the mother to swallow
- DO NOT wait for delivery of the placenta or cutting the cord
- اگر دوسرا بچہ پیٹ میں نہ ہو تو ماں کو فوراً مائٹروپروسٹول کی 3 گولیاں کھلا دیں۔
- گولیاں کھانے کیلئے ناڑوں کا ٹٹنے یا آنول کے باہر آنے کا انتظار نہ کریں۔





Misoprostol

**Attention!
Alert!**



If excessive bleeding continues even after taking Misoprostol tablets i.e. the sanitary pads are completely soaked with blood, and heavy bleeding continues, place 4 more Misoprostol tablets under the tongue and immediately take the woman to the hospital.



اگر مائزوپروسٹول کی گولیاں کھانے کے بعد بھی بہت زیادہ خون جاری رہے
یعنی خون جذب کرنے کیلئے جو کپڑا رکھا ہو وہ مکمل طور پر خون سے تر ہو جائے
اور خون جاری رہے تو مائزوپروسٹول کی مزید 4 گولیاں زبان کے نیچے رکھ دیں
اور فوراً ہسپتال لے جائیں۔

**خبردار!
ہوشیار!**




A doctor or midwife in the hospital will give treatment to control her bleeding and save her life.

ہسپتال میں ڈاکٹر یا مڈوائف ماں کا خون روکنے
کیلئے علاج کریں گے اور ماں کی جان بچائیں گے۔



The side effects of Misoprostol usually disappear within a few hours.

If after taking misoprostol tablets, the woman experiences:



Shivering / Chills

Cover her with a blanket or quilt.

جاڑا لگ رہا ہو یا کپکپی ہو تو:

- کمبل یا رضائی عورت کے اوپر ڈال دیں۔

ماٹزو پروسٹول کی گولیاں کھانے کی وجہ سے عام طور پر ظاہر ہونے والے ضمنی اثرات خود بخود چند گھنٹوں میں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔

اگر گولیاں کھانے کے کچھ دیر بعد:







Fever

- Sponge her with water
- Give her 2 tablets of Paracetamol to swallow

بخار ہو تو:

- کپڑے کو پانی سے بھگو کر ماتھے پر پٹیاں رکھیں۔
- دو گولیاں پیراسیٹامول (Paracetamol) کی کھلا دیں۔





If the shivering / chills and fever continue for more than 24 hours after the last dose of Misoprostol, then take the mother to a health facility.

اگر جاڑا اور بخار 24 گھنٹے تک رہے
تو ماں کو علاج کیلئے مرکزِ صحت لے جائیں۔



NCMNH House

36 - C, Street 14, Off. Khayaban – e – Shamsheer,
Phase V, D.H.A, Karachi – 75500, Pakistan.

☎ 92-21-35341597-8 ✉ info@ncmnh.org.pk

🌐 www.ncmnh.org.pk



Islamabad 44000, Pakistan

☎ 92-51-2894198

🌐 www.ipas.org