



نامکمل استقاط حمل کے علاج کیلئے ماٹرو پروسٹول کی گولیوں کا استعمال

زبان کے نیچے رکھ کر

میرے لئے مائع حمل کا بہترین طریقہ کیا ہے؟

نامکمل استقاط حمل کا علاج ایم۔ وی۔ اے (MVA) سے کروانے کے بعد آپ 10 دنوں میں دوبارہ حاملہ ہو سکتی ہیں اور ماٹرو پروسٹول کی گولیاں کھانے کے بعد 8 دنوں کے اندر۔ اگر آپ مائع حمل استعمال کرنا چاہتی ہیں تو حمل روکنے کے لیے کسی طریقے کا استعمال فوری شروع کریں۔ آپ مائع حمل کے طریقے ماٹرو پروسٹول کی گولیوں کے استعمال کے ساتھ ہی شروع کر سکتی ہیں۔



مجھے دوبارہ کب معائنہ کیلئے آنا چاہیے؟



عام طور پر دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اگر کچھ خطرناک علامات ظاہر ہوتی ہیں یا آپ کچھ اور مسائل پر بات کرنا چاہتی ہیں تو کسی بھی وقت آ سکتی ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتی ہیں کہ ماٹرو پروسٹول کی گولیوں کے ذریعہ پیدائی کی صفائی کا عمل کامیاب رہا تو معائنہ کیلئے دو ہفتے بعد آ سکتی ہیں۔

دوبارہ معائنہ (فالو اپ)

تاریخ:

جگہ:

وقت: فون:

ضمنی اثرات سے کیسے نمٹا جائے؟

پیٹ میں مروڑا درد کیلئے درد کم کرنے کی دوائی جاسکتی ہے۔ بخار کیلئے دوا کی عام طور پر ضرورت نہیں ہوتی، زیادہ پانی پینے اور آرام کرنے سے بھی مدد ملتی ہے۔ زیادہ تر ضمنی اثرات تھوڑی دیر بعد خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔



آپ کو صحت کے کارکن سے کب مدد لینی چاہیے؟

درج ذیل میں سے کسی بھی علامت کے ظاہر ہونے کی صورت میں آپ کو فوری مدد لینی چاہیے:



زیادہ خون کا جاری ہونا

بہت زیادہ خون آ رہا ہو: جس سے ہر ایک گھنٹے میں 2 سے زیادہ پیچڑیاں پینے ڈا پکڑے خون سے بھر جائیں اور یہ عمل 2 گھنٹے تک جاری رہے، خاص طور پر اگر اس کے ساتھ چکر اور بہت زیادہ تھکن بھی ہو۔



پیٹ میں مستقل مروڑا درد

مستل پیٹ میں مروڑا درد ہو جو کہ دوا آرام یا گرم سیکنے سے بھی دور نہ ہو رہا ہو۔



بخار

بخار جو ایک دن سے زیادہ رہے یا ماٹرو پروسٹول لینے کے اگلے دن سے کسی بھی دن شروع ہو۔ محسوس ہو کہ طبیعت بہت خراب ہے، تو لیدی راستے (وجائنا) سے معمول سے ہٹ کے یا دیگر دوا کا اخراج اور یا پیٹ میں درد ہو۔

گولیاں لینے کے بعد کیا ہوگا؟

ماٹرو پروسٹول رحم کو سکیزتی ہے۔ تو لیدی راستے (وجائنا) سے کچھ خون آئے گا اور پیٹ میں مروڑا درد ہوگا۔ کچھ خون کے جسے ہونے نکلنے بھی خارج ہو سکتے ہیں۔



پیٹ میں مروڑا درد



خون جاری ہونا

بہت ساری عورتوں کو ضمنی اثرات نہیں ہوتے


کچھ عورتوں کو بخار، سردی، متلی، اُلٹی یا دست ہو سکتے ہیں۔ یہ علامات ایک دن میں خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔



دست آنا



متلی اور تے آنا



چکچی / سردی لگنا / بخار ہونا



ماٹرو پروسٹول کی گولیوں سے نامکمل استقاط حمل کا علاج

اگر آپ کا استقاط حمل نامکمل ہو، تو آپ کا ماٹرو پروسٹول کی گولیوں سے بحفاظت اور مؤثر طریقے سے علاج ہو سکتا ہے۔ یہ گولیاں دو طریقوں سے استعمال کی جاسکتی ہیں، یا تو منہ کے ذریعے نگل کر یا پھر زبان کے نیچے رکھ کر۔



ماٹرو پروسٹول کی گولیاں کیسے لی جائیں؟ (زبان کے نیچے رکھ کر)

ماٹرو پروسٹول کی 3 گولیاں (600mcg) زبان کے نیچے رکھیں۔ گولیوں کو اس وقت تک زبان کے نیچے رکھیں جب تک کہ وہ گل نہ جائیں، یا وہ گھس گھسے تک رکھنے کے بعد جو کچھ باقی رہ جائے اسے پانی سے نگل لیں۔ ہر گھنٹے بعد یہ عمل دہرائیں (عام طور پر 1 سے 3 دفعہ استعمال کریں)



00:30





نا مکمل استقاط حمل کے علاج کیلئے ماٹرو پروسٹول کی گولیوں کا استعمال

منہ کے ذریعے



میرے لئے مانع حمل کا بہترین طریقہ کیا ہے؟

نا مکمل استقاط حمل کا علاج ایم۔ وی۔ اے (MVA) سے کرانے کے بعد آپ 10 دنوں میں دوبارہ حاملہ ہو سکتی ہیں اور ماٹرو پروسٹول کی گولیاں کھانے کے بعد 8 دنوں کے اندر۔ اگر آپ مانع حمل استعمال کرنا چاہتی ہیں تو حمل روکنے کے لیے کسی طریقے کا استعمال فوری شروع کریں۔ آپ مانع حمل کے طریقے ماٹرو پروسٹول کی گولیوں کے استعمال کے ساتھ ہی شروع کر سکتی ہیں۔



مجھے دوبارہ کب معائنے کیلئے آنا چاہیے؟



عام طور پر دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اگر کچھ خطرناک علامات ظاہر ہوتی ہیں یا آپ کچھ اور مسائل پر بات کرنا چاہتی ہیں تو کسی بھی وقت آ سکتی ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتی ہیں کہ ماٹرو پروسٹول کی گولیوں کے ذریعے پیدائنی کی صفائی کا عمل کامیاب رہا تو معائنہ کیلئے دو ہفتے بعد آ سکتی ہیں۔

دوبارہ معائنہ (فالو اپ)

تاریخ:

جگہ:

وقت: فون:

ضمنی اثرات سے کیسے نمٹا جائے؟

پیٹ میں مروڑ/ درد کیلئے درد کم کرنے کی دوائی جاسکتی ہے۔ بخار کیلئے دوا کی عام طور پر ضرورت نہیں ہوتی، زیادہ پانی پینے اور آرام کرنے سے بھی مدد ملتی ہے۔ زیادہ تر ضمنی اثرات تھوڑی دیر بعد خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔



آپ کو صحت کے کارکن سے کب مدد لینی چاہیے؟

درج ذیل میں سے کسی بھی علامت کے ظاہر ہونے کی صورت میں آپ کو فوری مدد لینی چاہیے:



زیادہ خون کا جاری ہونا

بہت زیادہ خون آ رہا ہو: جس سے ہر ایک گھنٹے میں 2 سے زیادہ پیچڑی پیڑڑا پڑے خون سے بھر جائیں اور یہ عمل 2 گھنٹے تک لگا تار جاری رہے، خاص طور پر اگر اس کے ساتھ چکر اور بہت زیادہ جھن جھن بھی ہو۔



پیٹ میں مستقل مروڑ/ درد

مستقل پیٹ میں مروڑ/ درد ہو جو کدوا، آرام یا گرم سیکنے سے بھی دور نہ ہو رہا ہو۔



بخار

بخار جو ایک دن سے زیادہ رہے یا ماٹرو پروسٹول لینے کے اگلے دن سے کسی بھی دن شروع ہو۔ محسوس ہو کہ طبیعت بہت خراب ہے، تولیدی راستے (دجائنا) سے معمول سے ہٹ کے یا بدبودار مواد کا اخراج اور/یا پیٹ میں درد ہو۔

گولیاں لینے کے بعد کیا ہوگا؟

ماٹرو پروسٹول رحم کو سکیرتی ہے۔ تولیدی راستے (دجائنا) سے کچھ خون آئے گا اور پیٹ میں مروڑ/ درد ہوگا۔ کچھ خون کے جھے ہوئے نکلنے بھی خارج ہو سکتے ہیں۔




پیٹ میں مروڑ/ درد

خون جاری ہونا

بہت ساری عورتوں کو ضمنی اثرات نہیں ہوتے

کچھ عورتوں کو بخار، سردی، متلی، اُلٹی یا دست ہو سکتے ہیں۔ یہ علامات ایک دن میں خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔



دست آنا

متلی اور تے آنا



کچی/سردی لگنا/ بخا ہونا

ماٹرو پروسٹول کی گولیوں سے نا مکمل استقاط حمل کا علاج

اگر آپ کا استقاط حمل نا مکمل ہو، تو آپ کا ماٹرو پروسٹول کی گولیوں سے بحفاظت اور مؤثر طریقے سے علاج ہو سکتا ہے۔ یہ گولیاں دو طریقوں سے استعمال کی جاسکتی ہیں، یا تو منہ کے ذریعے نگل کر یا پھر زبان کے نیچے رکھ کر۔



ماٹرو پروسٹول کی گولیاں کیسے لی جائیں؟ (منہ کے ذریعے)

تین گولیاں (600 mcg) پانی کے ساتھ نگل لیں۔

