


## ماٹزو پروسٹول کی گولیوں سے پوشیدہ اسقاط حمل کا علاج

اگر آپ کا اسقاط حمل پوشیدہ ہو تو آپ کا ماٹزو پروسٹول کی گولیوں سے بحفاظت اور مؤثر طریقے سے علاج ہو سکتا ہے۔ یہ گولیاں دو طریقوں سے استعمال کی جاسکتی ہیں، یا تو زبان کے نیچے رکھ کر، یا پھر تولیدی راستے (وجائنا) کے اندر رکھ کر۔



## ماٹزو پروسٹول کی گولیاں کیسے لی جائیں؟ (زبان کے نیچے رکھ کر)

ماٹزو پروسٹول کی 3 گولیاں (600mcg) زبان کے نیچے رکھیں۔ گولیوں کو اس وقت تک زبان کے نیچے رکھیں جب تک کہ وہ گھل نہ جائیں، یا آٹھ گھنٹے تک رکھنے کے بعد جو کچھ باقی رہ جائے اسے پانی سے نگل لیں۔ ہر گھنٹے بعد یہ عمل دہرائیں (عام طور پر 1 سے 3 دفعہ استعمال کریں)



00:30



زبان کے نیچے رکھ کر

## گولیاں لینے کے بعد کیا ہوگا؟

ماٹزو پروسٹول رحم کو سکیرتی ہے۔ تولیدی راستے (وجائنا) سے کچھ خون آئے گا اور پیٹ میں مروڑا درد ہوگا۔ کچھ خون کے جھے ہونے نکلنے بھی خارج ہو سکتے ہیں۔




پیٹ میں مروڑا درد

خون جاری ہونا

## بہت ساری عورتوں کو ضمنی اثرات نہیں ہوتے

کچھ عورتوں کو بخار، سردی، متلی، اٹلی یا دست ہو سکتے ہیں۔ یہ علامات ایک دن میں خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔



دست آنا

متلی اور تے آنا

کچی / سردی لگنا / بخار ہونا

زبان کے نیچے رکھ کر

## ضمنی اثرات سے کیسے نمٹنا جائے؟

پیٹ میں مروڑا درد کیلئے درد کم کرنے کی دوائی جاسکتی ہے۔ بخار کیلئے دوا کی عام طور پر ضرورت نہیں ہوتی، زیادہ پانی پینے اور آرام کرنے سے بھی مدد ملتی ہے۔ زیادہ تر ضمنی اثرات تھوڑی دیر بعد خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔



## آپ کو صحت کے کارکن سے کب مدد لینا چاہیے؟

درج ذیل میں سے کسی بھی علامت کے ظاہر ہونے کی صورت میں آپ کو فوری مدد لینا چاہیے:



زیادہ خون جاری ہونا

بہت زیادہ خون آ رہا ہو: جس سے ہر ایک گھنٹے میں 2 سے زیادہ بیٹری پیڑ ڈا کپڑے خون سے بھر جائیں اور یہ عمل 2 گھنٹے تک لگا تار جاری رہے، خاص طور پر اگر اس کے ساتھ چکر اور بہت زیادہ جھکن بھی ہو۔



پیٹ میں مستقل مروڑا درد

مسلل پیٹ میں مروڑا درد جو کہ دوا، آرام یا گرم سیکیٹی سے بھی دور نہ ہو رہا ہو۔



بخار

بخار جو ایک دن سے زیادہ رہے یا ماٹزو پروسٹول لینے کے اگلے دن سے کسی بھی دن شروع ہو۔ محسوس ہو کہ طبیعت بہت خراب ہے، تولیدی راستے (وجائنا) سے معمول سے بہت کے یا بدبودار مواد کا اخراج اور یا پیٹ میں درد ہو۔

زبان کے نیچے رکھ کر

## میرے لئے مانع حمل کا بہترین طریقہ کیا ہے؟

پوشیدہ اسقاط حمل کا علاج ایم۔وی۔ای (MVA) سے کروانے کے بعد آپ 10 دنوں میں دوبارہ حاملہ ہو سکتی ہیں اور ماٹزو پروسٹول کی گولیاں کھانے کے بعد 8 دنوں کے اندر۔ اگر آپ مانع حمل استعمال کرنا چاہتی ہیں تو حمل روکنے کے لیے کسی طریقہ کا استعمال فوری شروع کریں۔ آپ مانع حمل کے طریقے ماٹزو پروسٹول کی گولیوں کے استعمال کے ساتھ ہی شروع کر سکتی ہیں۔



## مجھے دوبارہ کب معائنہ کیلئے آنا چاہیے؟



عام طور پر دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اگر کچھ خطرناک علامات ظاہر ہوتی ہیں یا آپ کچھ اور مسائل پر بات کرنا چاہتی ہیں تو کسی بھی وقت آ سکتی ہیں۔

اگر آپ جاننا چاہتی ہیں کہ ماٹزو پروسٹول کی گولیوں کے ذریعہ بچہ دانی کی صفائی کا عمل کامیاب رہا تو معائنہ کیلئے دو ہفتے بعد آ سکتی ہیں۔

## دوبارہ معائنہ (فالو اپ)

تاریخ:

جگہ:

وقت:

فون:



پوشیدہ

# اسقاط حمل کے علاج کیلئے ماٹزو پروسٹول کی گولیوں کا استعمال

زبان کے نیچے رکھ کر



زبان کے نیچے رکھ کر

## مازوپروستول کی گولیوں سے پوشیدہ اسقاط حمل کا علاج

اگر آپ کا اسقاط حمل پوشیدہ ہو تو آپ کا مازوپروستول کی گولیوں سے بحفاظت اور موثر طریقے سے علاج ہو سکتا ہے۔ یہ گولیاں دو طریقوں سے استعمال کی جاسکتی ہیں، یا تو زبان کے نیچے رکھ کر، یا پھر تولیدی راستے (وجائنا) کے اندر رکھ کر۔



## مازوپروستول کی گولیاں کیسے لی جائیں؟ (تولیدی راستے کے ذریعے)

خون نہ پڑنے کی صورت میں مازوپروستول کی 4 گولیاں (800mcg) تولیدی راستے (وجائنا) کے اندر رکھیں۔ ضرورت پڑنے پر یہ عمل ہر 3 گھنٹے کے بعد دہرائیں۔ (عام طور پر 1 سے 3 خوراکیں)



تولیدی راستے (وجائنا) میں 3 مختلف طریقوں سے گولیاں رکھی جاسکتی ہیں۔

تولیدی راستے (وجائنا) کے ذریعے

## گولیاں لینے کے بعد کیا ہوگا؟

مازوپروستول رحم کو سکیزتی ہے۔ تولیدی راستے (وجائنا) سے کچھ خون آئے گا اور پیٹ میں مروڑا درد ہوگا۔ کچھ خون کے جھے ہونے نکلنے بھی خارج ہو سکتے ہیں۔




پیٹ میں مروڑا درد

خون جاری ہونا

## بہت ساری عورتوں کو ضمنی اثرات نہیں ہوتے

کچھ عورتوں کو بخار، سردی، متلی، اٹلی یا دست ہو سکتے ہیں۔ یہ علامات ایک دن میں خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔



دست آنا

متلی اور تے آنا



کچی/سردی لگنا/بخار ہونا

تولیدی راستے (وجائنا) کے ذریعے

## ضمنی اثرات سے کیسے نمٹا جائے؟

پیٹ میں مروڑا درد کیلئے درد کم کرنے کی دوائی جاسکتی ہے۔ بخار کیلئے دوا کی عام طور پر ضرورت نہیں ہوتی، زیادہ پانی پینے اور آرام کرنے سے بھی مدد ملتی ہے۔ زیادہ تر ضمنی اثرات تھوڑی دیر بعد خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔



## آپ کو صحت کے کارکن سے کب مدد لینا چاہیے؟

درج ذیل میں سے کسی بھی علامت کے ظاہر ہونے کی صورت میں آپ کو فوری مدد لینا چاہیے:



زیادہ خون جاری ہونا

بہت زیادہ خون آ رہا ہو۔ جس سے ہر ایک گھنٹے میں 2 سے زیادہ بیٹری پیڑ ڈا کپڑے خون سے بھر جائیں اور یہ عمل 2 گھنٹے تک لگاتار جاری رہے، خاص طور پر اگر اس کے ساتھ پکارا بہت زیادہ جھگن بھی ہو۔



پیٹ میں مستقل مروڑا درد

مسلل پیٹ میں مروڑا درد جو کہ دوا، آرام یا گرم سیکنے سے بھی دور نہ ہو رہا ہو۔




بخار

بخار جو ایک دن سے زیادہ رہے یا مازوپروستول لینے کے اگلے دن سے کسی بھی دن شروع ہو۔ محسوس ہو کہ طبیعت بہت خراب ہے، تولیدی راستے (وجائنا) سے مہول سے ہٹ کے یا بدبودار مواد کا اخراج اور یا پیٹ میں درد ہو۔

تولیدی راستے (وجائنا) کے ذریعے

## میرے لئے مانع حمل کا بہترین طریقہ کیا ہے؟

پوشیدہ اسقاط حمل کا علاج ایم۔ وی۔ اے (MVA) سے کروانے کے بعد آپ 10 دنوں میں دوبارہ حاملہ ہو سکتی ہیں اور مازوپروستول کی گولیاں کھانے کے بعد 8 دنوں کے اندر۔ اگر آپ مانع حمل استعمال کرنا چاہتی ہیں تو حمل روکنے کے لیے کسی طریقے کا استعمال فوری شروع کریں۔ آپ مانع حمل کے طریقے مازوپروستول کی گولیوں کے استعمال کے ساتھ ہی شروع کر سکتی ہیں۔



## مجھے دوبارہ کب معائنے کیلئے آنا چاہیے؟

عام طور پر دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اگر کچھ خطرناک علامات ظاہر ہوتی ہیں یا آپ کچھ اور مسائل پر بات کرنا چاہتی ہیں تو کسی بھی وقت آ سکتی ہیں۔



اگر آپ جاننا چاہتی ہیں کہ مازوپروستول کی گولیوں کے ذریعے پیدوانی کی صفائی کا عمل کامیاب رہا تو معائنہ کیلئے دو ہفتے بعد آ سکتی ہیں۔

## دوبارہ معائنہ (فالو اپ)

تاریخ:

جگہ:

وقت:

فون:

تولیدی راستے (وجائنا) کے ذریعے



## پوشیدہ

# اسقاط حمل کے علاج کیلئے مازوپروستول کی گولیوں کا استعمال

## تولیدی راستے (وجائنا) کے ذریعے



تولیدی راستے (وجائنا) کے ذریعے

