




علمی ادارہ صحت

# طبی صورتِ حالات کی مناسبت سے مانعِ حمل طریقوں کے استعمال کی کسوٹی



وہ طبی صورتِ حالات جن کی موجودگی میں تمام مانعِ حمل طریقے زمرہ نمبر ۱ اور ۲ میں آتے ہیں۔  
تولیدی صورتِ حال:

- 1 چھاتی کی سادی بیماری یا گلٹی      2 انڈے دانی کی سادی رسوی یا پانی کی تھیں      3 ماہواری کے دوران شدید درد کا ہونا  
 4 ماہواری کا خون پیپٹ میں گرنے کی بیماری (Endometriosis)      5 ماضی میں حمل میں ذایبٹس کا ہونا      6 ماضی میں حمل میں فشارِ خون ہونا  
 7 ماضی میں پیپڑ و کا آپریشن یا سیزیرین سیکشن      8 بے قاعدہ، زیادہ یا لمبی دریتک ماہواری کا چلتا جس کی وجہ معلوم نہ ہو      9 ماضی میں ٹیوب میں حمل ہونا  
 10 ماضی میں پیپڑ و کا ورم رہ چکا ہو      11 ماضی میں حمل ضائع ہوا ہوگر ورم نہ ہوا ہو      12 زچگی کے 6 ماہ یا اس سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہو

طبی صورت حال

- 11 دل کے والوں کی سادہ بیماری، جس کے ساتھ کوئی مدد نہیں ہو 12 جگر کی سورش، سر اینامی موجودہ

10 خون کی طاہری نہیں کی بیماری، پھولی ہوئی رگوں کی بیماری 9 تھائیر وڈ کی بیماری 10 تپ دق (پیڑو کے علاوہ)

8 خون کی کمی چاہے وہ فولاد کی کمی سے ہو یا سکل سیل کی بیماری ہو یا تھیلیسیما 9 تھائیر وڈ کی بیماری 10 تپ دق (پیڑو کے علاوہ)

4 خون کی کمی چاہے وہ فولاد کی کمی سے ہو یا سکل سیل کی بیماری ہو یا تھیلیسیما 5 ملیریا 6 جگر کی معمولی بیماری

3 H.I.V کی بیماری، جو بالکل معمولی ہوا و مریض کو کوئی علامات نہ ہوں WHO شیعہ 1 یا 2

متفرق صورت حالات

- 1 نو عمر بچیاں (13 سے 18 سال تک) 2 ماضی میں خاندان میں چھاتی کے سرطان کی موجودگی 3 خاندان میں خون کی نسوس میں خون جنے کا واقعہ  
 4 وہ خاتون جن کا V.I.P.H کی بیماری میں مبتلا ہونے کا زیادہ خدشہ ہو 5 کوئی آپریشن جس کے بعد زیادہ تک دیر چلے کی پابندی نہ ہو  
 6 اینٹی بائیوٹک کا استعمال علاوہ رائیم پیسم اور رینفایوٹن

سوائے چند مخصوص صورت استعمال کر سکتی ہیں۔

- |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| (مشترک کا مطلب ہے ابھی تاکل ایٹراؤنی آئی اور پر جسٹر و جن کا مرکب) |
| 1 مشترکہ مانع حمل یونکہ (CIC)                                      |
| 2 مشترکہ مانع حمل گولی (COC)                                       |
| 3 کوپ کا چھلہ (Cu-IUD)                                             |
| 4 مشترکہ گول دارہ (CVR)                                            |
| 5 مانع حمل یونکہ پٹھی یا جلد میں استعمال کے لئے (IM) (SC) (DMPA)   |
| 6 اینٹوجنٹرل (ETG)                                                 |
| 7 لیونار جنٹرل (LNG)                                               |
| 8 ہار مون والا چھلہ (NET-EN)                                       |
| 9 مانع حمل یونکہ (LNG-IUD)                                         |
| 10 صرف پر جسٹر و جن والی گولی (POP)                                |

*WHO medical eligibility criteria wheel for contraceptive use - 2015 update*

© Girls and Women Health Initiative (2016)

اس پہیے کے بارے میں:

اس پہیے کے باہر والے بڑے حصے میں صورتِ حالات اور بیماریاں درج ہیں جبکہ اندر والے چھوٹے حصے میں مختلف مانعِ حمل طریقے لکھے گئے ہیں۔ درمیان کی سیدھی لکیر میں نمبر درج ہیں۔ یہ ایک طرح کی کسوٹی ہے جو مختلف خواتین اور ایسی بھی صورتِ حالات کے مطابق ان کے لئے ہترین، مناسب اور محفوظ مانعِ حمل طریقے کا انتخاب کرنے میں رہنمائی پختہ ہے۔ یہ تمام معلومات عالمی ادارہ صحت (WHO) کی مانعِ حمل طریقوں کی رہنمائی کی کتاب "طبی مناسبت کی کسوٹی برائے مانعِ حمل طریقے، پانچواں شمارہ، سال 2015" سے لے گئی ہے۔ اس کا مقصد تمام خواتین کے لئے جن کو کوئی عارضہ لاحق ہے یا عمومی صحت کا کوئی منسلک درپیش ہے، مفہیر، محفوظ اور قابل اعتماد مانعِ حمل طریقے کی فراہمی ہے۔

اس پہیے میں 9 سب سے زیادہ استعمال شدہ مانعِ حمل طریقوں کے بارے میں سفارشات شامل ہیں۔

- 1 مانعِ حمل گولیاں (کم مقدار والی مانعِ حمل گولیاں، زیادہ سے زیادہ 35.5 انگل و گرام اس تھیں ایک اڈی آل) (COC)
- 2 مانعِ حمل پیچ (P)
- 3 مانعِ حمل چلہ (CVR)
- 4 مانعِ حمل یکہ جس میں ایسٹرو جن اور پرو جیسٹروون دونوں شامل ہیں (CIC)
- 5 پرو جیسٹروں کی مانعِ حمل گولیاں (POP)
- 6 مانعِ حمل یکہ جس میں صرف پرو جیسٹروں ہے (DMPA) (پھی میں یا جلد میں) یا NET-EN (صرف پٹھے میں)
- 7 امپلانٹ (صرف پرو جیسٹروں) (LNG/ETG)
- 8 مریاں (لیونار جریل والا چلہ) (Cu-IUD)
- 9 عام چھلا (کوپا چھلا) (LNG)

اس پہیے کو استعمال کرنے کا طریقہ:

یہ پہیہ اندر والی چھوٹی پلیٹ پر لکھے گئے مختلف مانعِ حمل طریقوں کو باہر والی بڑی پلیٹ پر لکھی گئی مختلف طبی خصوصیات اور بیماریوں کی تفصیل سے موزوں مناسب دیتا ہے۔ چھوٹی پلیٹ میں واقع سیدھی لکیر میں تحریر کردہ نمبر آپ کو بتاتے ہیں کہ آئاؤ خصوصیات بیماری والی خاتون کے لئے وہ خاص مانعِ حمل طریقہ مناسب ہے یا نہیں۔

نمبر شمار

1 یہ طریقہ آپ بے فکری سے استعمال کر سکتے ہیں	جی ہاں (اس طریقے کا استعمال کیا جا سکتا ہے)
2 عمومی طور پر یہ طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے	جی نہیں (اس طریقے کا استعمال نہ کریں)
3 اس طریقے کا استعمال عمومی طور پر مناسب نہیں جب تک کہ کوئی اور ہتر اور محفوظ مانعِ حمل طریقہ میسر نہ ہو یا قابل قبول نہ ہو	جی نہیں (اس طریقے کا استعمال نہ کریں)
4 اس طریقے کو ہرگز استعمال نہ کریں	جی نہیں (اس طریقے کا استعمال نہ کریں)

نمبر 1 اور 4 واضح سفارشات ہیں جبکہ نمبر 2 اور 3 کے لئے خصوصی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے اور اس خاتون کا خاص دھیان رکھنا ہو گا۔

☆ کچھ صورتوں میں کوئی پابندی نہیں۔ یعنی بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جن کے باوجود ہر مانعِ حمل طریقہ محفوظ سمجھا جاتا ہے یعنی نمبر 1 اور 2۔ اس طرح کے کچھ حالات پہیے کی کچھی طرف رقم ہیں۔

☆ کچھ مخصوص خواتین کے علاوہ تمام خواتین مانعِ حمل ایسی گولیاں، کنڈوم اور سماجی رویوں کے مطابق مختلف مانعِ حمل طریقے استعمال کر سکتی ہیں۔ خصوصی شرائط کے ساتھ 6 ماہ تک پچھے کوئی ملک طور پر اپنا دودھ پلانا (LAM) بھی ایسا ہی طریقہ ہے۔

☆ کنڈوم کے استعمال کی صورت میں متواتر اور کم درست طریقے سے استعمال ہی افادیت کا باعث ہے اور یہی جنسی طور پر پھیلنے والی بیماریاں مثلاً ایڈز سے بجاوہ کا خاص من ہے۔

## ہنگامی حالات یا ایمیز جنسی میں استعمال کے لئے مانعِ حمل گولیاں

حال	COC مشترک مانعِ حمل گولی لا گونیں	LNG لیونار جریل لا گونیں	UPA یوپی پر ٹسل اسٹیٹ لا گونیں
حمل			
4			
جنسی زیادتی کی صورت میں			
1۔ جنسی طور پر مستقل ہونے والی بیماریوں کا زیادہ خدشہ			
2۔ جنسی طور پر مستقل ہونے والی بیماریوں کا کم خدشہ			


COC = مشترک مانعِ حمل گولی، LNG = لیونار جریل، UPA = یوپی پر ٹسل اسٹیٹ، NA = لا گونیں

## ہنگامی حالات مانعِ حمل کے طور پر چھلے کا استعمال (Cu-IUD)

یہ طریقہ حمل روکنے کے لئے بے حد موثر ہے۔ اسے جنسی مlap کے 5 روز کے اندر اس مقصد کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اگر انڈے کے نکلنے کا وقت متعین کیا جاسکے تو اسے 5 دن کے بعد بھی استعمال کیا جاسکتا ہے تاہم اس طریقے کا انڈے کے نکلنے کے وقت سے 5 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔

عام چھلے کو رکھنے کے لئے جو احتیاطی شرائط ہیں وہ تمام ایمیز جنسی یا ہنگامی حالات میں مانعِ حمل کے طریقے کے لئے رکھنے جانے والے چھلے کے استعمال پر لا گوہوں گی۔

صورتِ حال	چھلا (Cu-IUD)
حمل	
4	
جنسی زیادتی کی صورت میں	
1۔ جنسی طور پر مستقل ہونے والی بیماریوں کا زیادہ خدشہ	
2۔ جنسی طور پر مستقل ہونے والی بیماریوں کا کم خدشہ	



- A اگر یونسکو اس مانچ حل طریقہ کو استعمال کرنے کے دروازہ شروع ہو جائے تو آپ اس مانچ حل طریقہ توجہ باری رکھ سکتے ہیں۔

B اگر جنی تعلق سے لگنے والی بیماریاں مثلاً گنوری یا کلے مینیڈیا کے ہوئے کافی زیادہ غشہ ہو تو اس طریقہ نمبر 3 سمجھا جائے۔

C اگر اراضی میں پُرپُر کا وہمہ پکایتے تو تمام اس مانچ حل طریقہ کو 1 سمجھیں شمولیہ کو پکا چھلہ (IUD)۔

D اگر پچ گن ہفت سے کم کا عرصہ گزارہ ہے تو وہ خاتون پچ کو دو دنہیں پلاری اور اراضی میں شریانوں میں خون جنم کوئی واقعیتیں ہو تو نمبر = 3 سمجھیں۔

E اگر پچ کو دو دنہیں پلاری تو = 1 سمجھا جائے۔

F اگر پچ کو 6-7 دنے تک اس سے زیادہ وقت ہو تو پچ کا ہے اور پچ کو دو دنہیں پلاری تو = 1 سمجھیں۔

G اگر پچ کو 27 دنے تک اس سے زیادہ وقت ہو تو پچ کا ہے اور پچ کو دو دنہیں پلاری تو = 1 سمجھیں۔

H اگر پچ دنیا بھر کی اندر میں ساخت اس حد تک بگزیری ہوئی ہے کہ چھار کھنکھنیں کلکل ہو گا تو نمبر = 4 سمجھیں۔

I اگر سادہ رسوبی یا سرطان یا پٹا ٹوما ہے تو CIC = 3 اور اگر سرطان یا پٹا ٹوما ہے تو CIC = 3/4 سمجھیں۔

J 3 = CIC L اگر خون پتلکار نے والی ادویات کا با قاعدہ استعمال کر رہی ہیں تو = 2 سمجھیں۔

M اگر یہ سورجی اس مانچ حل طریقہ کے استعمال کے دروازہ پیدا ہوئی ہے تو اسی اور ہماری مولی طریقہ پر منتقل کر دیں۔

N خطہ بڑھانے والے عوام: زیادہ عمر، سکریٹ نوٹی، زیابیس، فخارخون، بہتر نیازہ محتاجاً پر کوئی لیشون کی بیماری

O اگر فرشخون نہ پہنچ جاسکتا اور اراضی میں کبھی بلکہ پریش زیادہ نہیں رہتا تو تمام طریقہ استعمال کی جائیکے ہیں۔

P اگر عمر 18 سال سے کم ہے اور دوزن بہت زیادہ ہے تو DMPA /NET-EN کو = 2 سمجھا جائے۔

Q زیابیس کی صورت میں چاہے وہ انسولین استعمال کر رہی ہوں یا گلیاں اگر بیماری کا درانی 20 سال سے زائد ہے یا جسم کے مختلف حصوں پر اثر ہو جائی ہے سمجھیں اور COC/P/CVR, CIC = 3/4 DMPA, NET-EN = 3 سمجھیں۔

R اگر خاتون روزانہ 15 سے کم سکریٹ استعمال کرتی ہیں تو CIC = 2 اور اگر وہ 15 سے زائد سکریٹ روزانہ استعمال کرتی ہیں تو COC/P/CVR = 4 کے۔


S در حقیقت سے پہلے والی علامات مثلاً عالمی بھجتی روشنیاں ظراحتی ہوں اور عمر 35 سال یا زائد ہو تو

T متفرق دوائیوں کا استعمال مثلاً مرگی کی کچھ دوائیاں COC/P/CVR, CIC = 1 اور POP = 2 کے۔

U متفرق دوائیوں کا استعمال مثلاً مرگی کی کچھ دوائیاں CIC = 2 اور POP = 1 اور یہ موڑائی جیں استعمال کرتی ہیں تو

V اگر ایڈز کے لئے ایڈز ریٹرو ایکسل (ARV) دوائیاں استعمال کی جا رہی ہیں تو

W 2 = CICs X 2 = NET-EN = DMPA W 1 = DMPA 2 = COC/P/CVR, CIC, POP, NET-ET, Implants Z اگر عالمی ادارہ صحت (WHO) کے مطابق ایڈز کی شیخ 3 یا 4 ہے یا شدید بیماری کی صورت میں IUD = 3 سمجھیں۔



1. اس طریقے کو بے فکری سے استعمال کر سکتے ہیں
2. عمومی طور پر اس طریقے کو استعمال کر سکتے ہیں
3. اس طریقے کا استعمال عام طور پر پنیس کرنا چاہیے، بھروسی کی حالت میں اگر کوئی اور طریقہ نہ ہو یا قابلِ قبول نہ ہو تو کسی تجربہ کا ردا اکٹھ سے رابطہ کریں
4. اس طریقے کو ہرگز استعمال نہ کریں

عالیٰ ادارہ محنت کی طبی صورت حالات کی مناسبت سے مانع جمل طریقوں کے استعمال کی کسوٹی (2015)

یہ معلومات عالیٰ ادارہ محنت (WHO) کی مانع جمل طریقوں کی رہنمائی کی کتاب  
"طبی مناسبت کی کسوٹی برائے مانع جمل طریقے سال 2015" سے لی گئی ہیں۔